N°. 52.

Observation ~~sur~~ d'une ouverture du cadavre faitte ce Matin 17 mars 1774 par Monsieur piplet le jeune et moy

Monsieur gautier ancien secretaire de la cavalerie de france portoit ~~dès sa~~ du cote droit plus tendre jeunesse une hernie ~~inguinal~~ antero epiplocel inguinal des plus complettes, la portion d'intestin etoit coulante et d'autant plus dificile a contenir que la peau du Malade d'une texture délicatte s'excorioit aisement a la moindre Compression Continue; ce qui l'avoit fait depuis pres de 50 ans varier de Bandages, et de chirurgiens Bandagistes. Mr piplet le jeune Etoit le seul qui depuis plusieurs année par des soins assidues et des Bandages variée de forme et de solidité venoit a Bout de Contenir la hernie au moin pour quelques tems le Malade sujet a la goutte erratique depuis une vingtaine d'année l'eprouvoit aux deux pieds deux ou trois fois dans chaques (?) lorsqu'apres un accest assez long, au mois de juin 1772 cet humeur se porta sur les reins et les intestins sans en trop deranger les fonctions depuis cet Epoque la goutte n'est reparu qu'une ou deux fois aux pieds encore tres legerement au mois de 7bre 1773 Mr piplet fit la reduction de la hernie que j'avois moy meme reduit plusieurs fois et reconu une portion assez considerable d'epiploon dans la tumeur ce qui ne rendit pas la reduction plus dificile que de coutume le tout fut contenu ~~reduit~~ par un Bandage tres leger dont le malade se debarassa assez promptement sous pretexte d'incomodité depuis cet Epoque la hernie n'est plus reparu le Malade a jouy d'une assez Bonne santé jusqu'a la fin de Novembre dernier qu'il se plaignit de Constipation et de douleurs de colique pour les quels les Remedes convenables furent administré et variée par Mr Malouette et nous qui estions convencu que les accidents dependoient de la goutte nous examinames souvent le lieu qu'avoit occupé la hernie sans la retrouver enfin il vient de mourir hydropique agé de 85 ans. curieux d'examiner ce qui avoit concouru a la disparution total d'une hernie aussy ancienne que volumine(use) assez nous avons vu a l'ouverture de son Cadavre une grande partie

ARC 16d 3ae ° 87

des intestins adherents ala face interne du peritoine depuis la cre
ste anterieur delos des isles du coté droit jusque vers le plis de lain
du coté gauche le reste de la masse intestinal adherente dans tout
ses circonvolutions demaigne que le mezantere qui etoit obstrué
dans satotalité ne fesant qu'un corp solide qui etoit diminué
de son etendue consequament avoit pour ainsy dire atteré a luy
la longue portion dintestin et de peritoine qui formoit la hernie
qui desuitte setoient collee ~~...~~ par une inflammation successive, lanne au
et le cordon des vesseaux. etoient ~~...~~ libre le epiploon etoit entierement
fondu n'en trouvant plus que quelques filaments epars dans
les eaux qui remplissoient la capacité du ventre, d'ou nous
croyons pouvoir dire que les inflammations qui surviennent
dans cette Cette capacité peuvent produire quelques fois
cohesion des parties entre elles et la guerison des hernies
meme les plus anciennes

Coste [illegible]

Pipelet le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE